




Couverture du substrat

Algue
Corail



Station Chicot (réserve)

Station Fish Point (hors réserve)

Synthèse

La couverture corallienne est en légère diminution de puis 2007 sur la station Chicot (Réserve) avec toutefois une amorce de reprise en 2012.


Aucun phénomène de blanchissement corallien significatif n'a été observé depuis 2007, seule la station Chicot a été affectée de manière légère en 2010/2011

Les peuplements de poissons semblent en évolution positives (augmentation des Chaetodon) sur la station chicot.



Abondance des poissons

Herbivore
Carnivore



Station Chicot (réserve)

Station Fish Point (hors réserve)



Apparition de l'espèce *Syringodium filiforme* à partir de 2008 sur la station rocher Créole (pas de suivi avant 2010 sur la station Grand Case), accompagnée à partir de 2010 d'une diminution de la densité des *Thalassia testudinum* (station Rocher Créole).

La densité en Lambis est en diminution sur la station Rocher Créole et en augmentation sur la station Grand Case

Position des stations



● Station benthos et ichtyofaune en réserve

● Station herbier en réserve


■ Station benthos et ichtyofaune hors réserve

■ Station herbier hors réserve




Abondance et taille des Lambis vivant

Station Rocher Créole (réserve)




Station Grand Case (hors réserve)



Densité des herbiers

Station Rocher Créole (réserve)



Station Grand Case (hors réserve)

